

# AVES

## DE ALPEDRETE



AYUNTAMIENTO  
DE ALPEDRETE



# AVES

## DE ALPEDRETE

¿Quién no mira al cielo y ve un ave surcándolo?  
¿Quién no escucha un trino escondido entre los árboles?  
¿Quién no descubre un nido en un alero de una casa?  
¿Quién no se pregunta cómo se llama ese ave?

Esperamos que esta guía no solo sacie tu curiosidad,  
sino que también la despierte.

*Para valorar hay que conocer,*  
aunque solo sea con una pequeña selección  
de las numerosas especies que podemos encontrar  
en Alpedrete.

Es lo que pretendemos con esta guía.



AYUNTAMIENTO  
DE ALPEDRETE



AYUNTAMIENTO  
DE ALPEDRETE

Edita:  
Ayuntamiento de Alpedrete, 2018

© Textos: Esteban Durán Hernández  
Contacto: estebanduher@hotmail.com  
© Fotografías: Carlos López Cubillo  
Contacto: info@wildmoral.com

© Diseño y maquetación: mgrafico.com

Depósito Legal: M-21909-2018

# ÍNDICE

27	Abejero europeo	14	Culebrera europea	39	Mosquitero común
17	Abejaruco	37	Curruca cabecinegra	57	Mosquitero musical
25	Abubilla	37	Curruca capiroxada	39	Mosquitero papialbo
57	Acentor común	38	Curruca carrasqueña	57	Mosquitero silbador
44	Agateador común	38	Curruca rabilarga	49	Oropéndola
15	Águila calzada	38	Curruca zarcera	21	Paloma bravía
13	Águila imperial	57	Escribano montesino	21	Paloma torcaz
14	Águila real	56	Escribano soteño	40	Papamoscas cerrojillo
57	Alcaudón común	49	Estornino negro	52	Pardillo común
45	Alcaudón real	49	Estornino pinto	20	Perdiz roja
10	Ánade real	10	Garza real	33	Petirrojo
47	Arrendajo	19	Gavilán común	55	Picogordo
24	Autillo	30	Golondrina común	28	Pico picapinos
31	Avión común	57	Golondrina dáurica	55	Piquituerto
18	Azor	50	Gorrión común	51	Pinzón real
31	Bisbita pratense	47	Grajilla	51	Pinzón vulgar
57	Búho chico	43	Herrerillo capuchino	27	Pito real
22	Búho real	42	Herrerillo común	20	Polla de agua
11	Buitre leonado	54	Jilguero	46	Rabilargo
12	Buitre negro	32	Lavandera blanca	17	Ratonero común
23	Cárabo	57	Lavandera cascadeña	40	Reyezuelo listado
41	Carbonero común	52	Lúgano	57	Reyezuelo sencillo
42	Carbonero garrapinos	26	Martín pescador	34	Ruiseñor común
19	Cernícalo vulgar	16	Milano negro	21	Tórtola turca
33	Chochín	15	Milano real	29	Totovía
24	Chotacabras cuellirrojo	36	Mirlo común	44	Trepador azul
11	Cigüeña blanca	43	Mito	46	Urraca
57	Cigüeña negra	23	Mochuelo	25	Vencejo común
29	Cogujada común			54	Verdecillo
57	Colirrojo real			53	Verderón común
34	Colirrojo tizón			57	Verderón serrano
48	Corneja negra			57	Zarcero común
57	Críalo			57	Zorzal alirrojo
57	Cuco			35	Zorzal charlo
48	Cuervo			35	Zorzal común

## LAS AVES DE ALPEDRETE

La biodiversidad es la variedad de la vida a diferentes niveles; así, tenemos variedad de especies, variedad de ecosistemas, de paisajes, etc. La conservación de la biodiversidad hace que los equilibrios naturales sean más estables y nuestra calidad de vida, mejor.

Una parte importante de la biodiversidad la constituyen las aves. El papel que éstas ejercen en el medio natural es fundamental, contribuyendo al equilibrio ecológico: dispersan las semillas de muchas especies de plantas, mantienen a raya las poblaciones de insectos y sirven de alimento a muchas especies de animales, por poner sólo algunos ejemplos. Por otro lado, es indudable el gran interés que las aves suscitan en el ser humano. Sus coloraciones, vistosidad e interesantes pautas de comportamiento hacen que sean muchas las personas que las estudien, realicen esfuerzos para conservarlas o simplemente salgan al campo a disfrutar de su observación.

El municipio de Alpedrete, con sus 12,64 Km<sup>2</sup>, es uno de los más pequeños de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, presenta una considerable diversidad ornitológica. Esto se debe, por un lado, a su localización estratégica en la rampa de la Sierra de Guadarrama, lo cual favorece que convivan especies propias de ambientes montanos con otras que no lo son. Por otro lado, resulta trascendental la variedad de hábitats que podemos encontrar- algunos de importante valor-, y que permite la presencia de aves con muy diferentes requerimientos ecológicos.


Hallamos, de esta manera, desde zonas urbanizadas, parques y jardines, hasta el área montañosa del cerro de Cabeza Mediana, pasando por robledal, dehesas de encinas y de fresnos, herbazales y matorrales.

Resulta destacable el efecto del tradicional aprovechamiento del granito, que ha generado la formación de canteras, las cuales probablemente son los más notables elementos del patrimonio cultural del municipio. Estas formaciones, en las que se producen fenómenos de encharcamiento, aparecen de forma dispersa en montes adeshados donde el aprovechamiento ganadero a lo largo de los años ha moldeado el paisaje. Se han originado, de esta forma, singulares ecosistemas que atraen tanto a aves propias de humedales como el martín pescador, así como especies rupícolas, como el búho real u otras típicas de dehesas, como es el caso de la abubilla.

En la presente guía se muestra una completa recopilación de las especies de aves que habitan en Alpedrete, describiendo sus características morfológicas o de comportamiento más interesantes para su identificación, así como el período del año en el que se pueden observar en el municipio, y sus hábitats característicos o lugares donde podemos observarlas. El objetivo es mostrar al lector una pequeña parte de la biodiversidad del municipio y ayudarle a descubrirla, comprenderla y, consecuentemente, a valorarla.


## TOPOGRAFÍA DEL AVE

No se emplea en esta guía un lenguaje excesivamente técnico para la descripción de las diferentes especies. No obstante, existen algunos términos sobre la morfología de las aves que conviene conocer para su completo entendimiento, así como el de otros textos. A continuación se muestra una imagen en la que se identifican las principales partes de la topografía de un ave:



## CÓMO USAR ESTA GUÍA

En esta guía se trata de aportar la información más interesante sobre cada especie, todo ello de forma simplificada y que resulte intuitiva para el lector. Para ello se ha seguido el siguiente esquema, que a continuación se explica mediante un ejemplo:



Además de estos datos, para cada especie se muestra información relevante para facilitar su identificación, tales como caracteres morfológicos o pautas de comportamiento. Además se aportan otros datos interesantes, curiosidades, así como los lugares del municipio donde, con más probabilidad, podremos observar a cada especie.



AVES  
DE ALPEDRETE

● **ÁNADE REAL**  
*Anas Platyrhynchos*  
50-60 CM/ MUY FÁCIL

El macho es inconfundible por el color verde iridiscente de cabeza y cuello, con un collar blanco al final del mismo. La hembra es de color parduzco moteado, con un espejuelo azulado en el ala. Es el pato más común del municipio. Muy adaptable en cuanto a su hábitat, aparece en canteras, cursos de agua y charcas, tanto de agua permanente como temporales. Su dieta es muy variada e incluye insectos, moluscos, peces, brotes y semillas. Pueden tener hasta 15 pollos, que son capaces de caminar, nadar y bucear a las pocas horas de nacer.



● **GARZA REAL**  
*Ardea cinerea*  
84-102 CM/ DIFÍCIL

Se distingue bien por su gran tamaño y su plumaje con predominancia de tonos grises, con las partes inferiores blancas; patas largas y pico con forma de estilete. Cuando vuela mantiene el cuello replegado. De carácter solitario, acude a charcas y canteras de lugares tranquilos, donde se alimenta de peces, renacuajos y otros animalillos, a los que captura al acecho, con un certero movimiento de la cabeza. Para reproducirse establece colonias de cría en lugares alejados del municipio, por lo que es más común observarla fuera del periodo reproductor, cuando tienen un comportamiento más gregario.



● **CIGÜEÑA BLANCA**  
*Ciconia ciconia*  
95-110 CM/ MUY FÁCIL

Su gran tamaño y su apego a las construcciones humanas y los campanarios-como el de la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora- para establecer sus nidos, hacen que sea una de las aves más populares y conocidas. Especie tradicionalmente migratoria transahariana, durante los últimos años muchos ejemplares deciden quedarse en la Península Ibérica. Las parejas utilizan año tras año los mismos nidos, a los que aportan nuevos materiales en cada temporada reproductora, por lo que van adquiriendo cada vez mayor tamaño. Las parejas emiten un sonido característico denominado "crotoreo", a la vez que arquean sus cuellos de forma sincronizada, ritual mediante el cual estrechan sus lazos.



● **BUITRE LEONADO**  
*Gyps fulvus*  
95- 110 CM/ FÁCIL

El gran tamaño que tiene esta rapaz, junto a sus alas anchas, cola corta y tonalidad grisácea, son caracteres diferenciadores cuando se la observa en vuelo. Forma colonias de cría, en zonas rocosas de la Sierra de Guadarrama, constituyendo el cercano macizo de La Pedriza uno de sus principales núcleos reproductores de la Comunidad de Madrid. Generalmente se desplazan en grupos, siendo Alpedrete lugar de paso habitual en sus largos desplazamientos, por lo que con relativa facilidad se pueden observar ejemplares sobrevolando el municipio. Se alimenta de carroña, y acude con asiduidad a vertederos.



● **BUITRE NEGRO**  
*Aegypius manachus*  
100-115 CM/ FÁCIL



Con sus casi tres metros de envergadura, es el ave de mayor tamaño que encontramos en Alpedrete. Su plumaje, de color negro y alas más rectangulares, dispuestas en posición completamente horizontal durante el planeo, sirven para distinguirlo del buitre leonado.

No es inusual observar ejemplares sobrevolando el municipio, y más raramente, posados en árboles o en rocas e incluso alimentándose de carroña en el suelo, principalmente de conejos. Aunque en su dieta incluye diferentes tipos de carroña, prefiere animales más

pequeños de los que se alimenta el buitre leonado. Establecen sus colonias de cría en zonas con árboles de gran porte, en los que construyen enormes nidos en forma de plataforma, donde cada pareja saca adelante un sólo pollo. Esta ave está catalogada como en Peligro de Extinción en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas y como Vulnerable en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. En los pinares de la Sierra de Guadarrama presenta una importante población, de unas 200 parejas.

● **ÁGUILA IMPERIAL**  
*Aquila adalberti*  
68-83 CM/ FÁCIL



Una de las más emblemáticas especies de la fauna ibérica, por su carácter endémico, por su belleza y por haber estado cerca de la extinción. Hoy en día su situación ha mejorado y ha vuelto a ocupar parte de sus antiguos territorios, aunque sigue siendo una especie amenazada. De menor tamaño que los buitres, se trata de la mayor de nuestras águilas después de la real. La podemos diferenciar de ésta por su coloración general más oscura y las llamativas manchas blancas de los hombros que presentan los individuos adultos. Los jóvenes pasan por varias fases

de coloración hasta llegar al plumaje definitivo. Generalmente construyen su nido en las copas de grandes árboles. El municipio de Alpedrete constituye lugar de campeo y territorio de caza de esta ave, siendo el conejo un elemento básico en su dieta, por lo que se la puede observar en fincas y terrenos donde este animal sea abundante, siempre en lugares donde la presencia humana no cause molestias excesivas.

● **ÁGUILA REAL**  
*Aquila chrysaetos*  
76-96 CM/ DIFÍCIL

La mayor de las águilas españolas. En vuelo se distingue de los buitres por su menor tamaño y su silueta más esbelta, y del águila imperial, por su cola ligeramente más larga y la ausencia de las manchas blancas en los hombros, características de los individuos adultos de éstas últimas. Al contrario que la imperial, prefiere construir el nido en paredes rocosas. Formidable cazadora, se atreve a atacar a animales que la superan en peso. Su dieta es muy variada, pudiendo alimentarse de aves, mamíferos, reptiles e incluso carroña. Se la puede observar sobrevolando los cerros y crestas del municipio y alrededores.



● **ÁGUILA CALZADA**  
*Hieraaetus pennatus*  
42-51 CM/ FÁCIL

Rapaz de mediano tamaño, existen individuos con dos tipos (o "fases") de coloración diferentes. Una con predominancia de blanco en las partes inferiores, y otra, menos abundante, de tonos marrones preponderantes. Gran cazadora, en ocasiones ejecuta vertiginosas picados para atrapar a sus presas.

En Alpedrete el conejo constituye uno de sus principales alimentos, pero también se alimenta de aves, roedores, reptiles e insectos. Para cazar tiene preferencia por los terrenos arbolados con claros, aunque no resulta difícil observarla sobrevolando casi cualquier lugar del municipio durante el periodo estival.



● **CULEBRERA EUROPEA**  
*Circaetus gallicus*  
62-69 CM/ MUY DIFÍCIL

Rapaz de considerable tamaño, presenta una coloración predominantemente blanca en las partes inferiores y una cabeza grande. Cuando caza se cierne con frecuencia, es decir, se queda suspendida en el aire mediante un aleteo constante. Esta ave se alimenta sobre todo de culebras, algunas de gran tamaño, con las que en ocasiones mantienen intensas luchas antes de tragárselas enteras. Alpedrete constituye un lugar de paso de estas rapaces durante sus movimientos migratorios, así como de campeo y, ocasionalmente, de cría.



● **MILANO REAL**  
*Milvus milvus*  
60-66 CM/ MUY FÁCIL

Una de las rapaces que con mayor facilidad podemos observar en el municipio a lo largo de todo el año, sobre todo en áreas forestales, pero en ocasiones también sobrevolando zonas humanizadas. De mediano tamaño, presenta un plumaje marrón anaranjado, con un moteado negro general en el cuerpo, y cabeza blanquecina. Su cola larga y ampliamente ahorquillada, lo diferencia bien del resto de rapaces. Bastante generalista y oportunista, se alimenta con frecuencia de carroña. Además caza conejos, roedores, insectos y otros animales que se pongan a su alcance.



● **MILANO NEGRO**  
*Milvus migrans*  
55-60 CM/ MUY FÁCIL



Similar al milano real, presenta una coloración más oscura y homogénea que éste, una cola levemente más corta y menos ahorquillada, y un tamaño ligeramente inferior. Al igual que el aquél, no es un buen cazador, pero sí un gran oportunista, por lo que con frecuencia atrapa animales heridos o enfermos. Además, se alimenta de carroña, acude a vertederos y pesca peces en lagos y embalses.

Es de las rapaces que se observa con

mayor facilidad en Alpedrete, dada su relativa abundancia, y a que no es especialmente recelosa a acercarse a los núcleos urbanos. Especie migratoria procedente de África, se la puede observar sobrevolando el municipio en busca de alimento o defendiendo sus territorios de cría. Construyen sus nidos en las copas de los árboles, y tienen la costumbre de adornarlos con cuerdas, plásticos y otros materiales artificiales.

● **RATONERO COMÚN**  
*Buteo buteo*  
46-58 CM/ FÁCIL

Rapaz mediana, de aspecto más robusto y compacto que otras de su tamaño. Puede presentar coloraciones bastante variables. Se diferencia del águila calzada porque ésta presenta alas más estrechas y cola más recta y angulosa. Ave oportunista en cuanto a su alimentación, caza mamíferos de pequeño tamaño, reptiles e insectos. También se alimenta de carroña, pudiendo aprovechar en ocasiones, cadáveres de animales atropellados. Se puede observar con relativa facilidad durante todo el año en zonas de vegetación forestal, casi siempre en vuelo, aunque a veces podemos sorprenderla posada en algún árbol u otro posadero.



● **ABEJERO EUROPEO**  
*Pernis apivorus*  
52-59 CM/ MUY DIFÍCIL

Cuando está en vuelo, esta ave se asemeja mucho al ratonero. Podemos diferenciarlo de éste, por el tamaño proporcionalmente mayor de las alas y la cola, lo que le da un aspecto menos compacto. Además presenta un barreado más marcado en las partes inferiores de alas y cuerpo. Su cabeza es proporcionalmente pequeña y las patas muy largas, adaptadas para escarbar en el suelo en busca de los panales de avispas, de las que se alimenta. Esta ave estival cría en zonas próximas a Alpedrete, por lo que es posible observar la sobrevolando los bosques del municipio y alrededores.



● **AZOR**  
*Accipiter gentilis*  
49-56 CM/ DIFÍCIL



Muy similar al gavilán, pero de mayor tamaño y con una cola proporcionalmente más corta que éste, y una morfología más robusta. Al igual que pasa con aquél, las hembras son considerablemente mayores.

Lo podemos encontrar planeando en zonas boscosas y sus alrededores, aunque no es de las aves más fáciles de observar en el municipio, dada su cos-

tumbre de permanecer posada entre el arbolado durante buena parte del día. Gran cazador, captura aves y mamíferos a los que suele sorprender volando entre la vegetación. Cuando captura sus presas, se las lleva a algún lugar cobijado entre la espesura para comérselas sin ser molestados por los córvidos u otros oportunistas.

● **GAVILÁN COMÚN**  
*Accipiter nisus*  
28-37 CM/ DIFÍCIL

Rapaz de pequeño tamaño, siendo las hembras ostensiblemente mayores que los machos. En vuelo es identificativa su coloración clara inferior, alas cortas y redondeadas, y cola larga. No resulta sencilla su observación, debido a que pasa mucho tiempo inmóvil, camuflado entre los árboles. Se alimenta principalmente de otra aves, a las que captura valiéndose de su gran habilidad para volar entre la espesura, lo que le permite sorprender a sus presas. Ave solitaria, la podemos encontrar en cualquier tipo de zona arbolada, incluso en parques y jardines, donde a veces acude a cazar.



● **CERNÍCALO VULGAR**  
*Falco tinnunculus*  
31-37 CM/ DIFÍCIL

Pequeña rapaz de aspecto esbelto, con cola y alas largas, siendo estas últimas estrechas y acabadas en punta. En vuelo realiza planeos que alterna con aleteos frecuentes. Para localizar a sus presas se mantiene suspendido en el aire mediante un batido continuo de las alas (cerniéndose). Se alimenta de micromamíferos, insectos y otros animalillos a los que atrapa dejándose caer al suelo. En Alpedrete es un ave escasa. Se puede observar en el Cerro del Cañal así como en otros lugares con baja densidad de arbolado.



## ● PERDIZ ROJA

*Alectoris rufa*

32-34 CM/ MUY DIFÍCIL

Ave de color marrón grisáceo en las partes superiores, destaca el dibujo blanco y negro de la garganta. Viven en grupos familiares. De hábitos terrestres, se esconden bien entre la vegetación y nos sobresaltan con su ruidoso vuelo cuando nos acercamos a pocos metros de ellas. Los ejemplares que encontramos en Alpedrete son procedentes de repoblaciones con fines cinegéticos. Se encuentran en zonas de matorral poco transitadas, principalmente en los alrededores del Cerro del Cañal.



## ● POLLA DE AGUA

*Gallinula chloropus*

32-35 CM/ MUY DIFÍCIL

Ave acuática con aspecto de gallina pequeña. Tanto el macho como la hembra presentan una coloración general negruzca con tonos pizarrosos, y un llamativo rojo en el escudo facial y en el pico. Nada sobre la superficie y camina silenciosa entre la espesura de la orilla. No resulta sencilla su observación en el municipio, pues se oculta bien entre la vegetación acuática, dado su carácter asustadizo. En muchas ocasiones tan sólo podremos detectar su presencia gracias a los agudos sonidos que emite. La podemos encontrar en canteras de la Dehesa Municipal que tengan suficiente vegetación ribereña.



## ● PALOMA BRAVÍA

*Columba livia*

31-34 CM/ MUY FÁCIL

Junto con la torcaz, es una de las dos palomas que habitan en Alpedrete. Se diferencia de aquella por carecer de mancha circular blanca en el cuello, y por presentar dos barras negras transversales en las alas. Además, en el municipio existen ejemplares cimarrones, con coloraciones variables. Viven en grupos de varios ejemplares, que permanecen buena parte del día alimentándose en el suelo. Las podemos observar con facilidad en los alrededores del parque de El Peralejo, entre otros lugares.



## ● PALOMA TORCAZ

*Columba palumbus*

40-42 CM/ MUY FÁCIL

De tamaño ligeramente mayor que la paloma bravía, los adultos presentan una mancha blanca característica a ambos lados del cuello. En vuelo, la podemos diferenciar de la bravía por tener la parte inferior de las alas de color gris mientras que en aquéllas es de color blanco. Para criar son solitarias y territoriales, y construyen su nido en las copas de los árboles. Se distribuyen prácticamente por todo el municipio.



## ● TÓRTOLA TURCA

*Streptopelia decaocto*

31-33 CM/ FÁCIL

Similar a una paloma pero de morfología más estilizada, presenta una coloración general de color claro, con un fino collar negro característico en el caso de los ejemplares adultos. Originaria de Asia y Oriente próximo, en los últimos años se ha extendido por gran parte de la Península Ibérica. De carácter solitario, es una especie urbana que podemos encontrar en algunos parques y jardines. Realiza un sencillo nido con ramitas, generalmente en las copas de los árboles.



## ● BÚHO REAL

*Bubo bubo*

57-75 CM/ DIFÍCIL



Rapaz nocturna de imponente tamaño, -la mayor de Europa- y cabeza grande en la que sobresalen unos penachos de plumas, con aspecto de orejas. Se trata de un superpredador, pues se alimenta de todo animal de igual tamaño o menor que se ponga a su alcance, incluidos otros depredadores. No obstante, donde el conejo es abundante, éste se convierte en el elemento básico de su dieta. Anida en repisas, nidos de otras aves e incluso en el suelo. De hábitos crepusculares y nocturnos, por lo que pasa bastante desapercibido

a pesar de su tamaño. El reclamo es un “buhuu” potente y grave, que se oye a gran distancia, y que podremos escuchar sobre todo en los meses de invierno. Resulta llamativo su silencioso aleteo, perfectamente adaptado para sorprender a sus presas en el silencio de la noche. Especie catalogada como Vulnerable en el Catálogo Regional de la Comunidad de Madrid, en Alpedrete encuentra su hábitat ideal en zonas escarpadas y poco transitadas, en las que haya abundancia de presas.

## ● CÁRABO

*Strix aluco*

37-43 CM/ MUY DIFÍCIL

Rapaz nocturna de mediano tamaño, aspecto rechoncho y cabeza proporcionalmente grande, carece de las características plumas conspicuas con forma de orejas que presentan algunas otras rapaces nocturnas. Permanece activo únicamente durante la noche, por lo que podremos detectar su presencia principalmente gracias a su canto (ululato), que consiste en un lúgubre sonido. Especie escasa en el municipio, aparece principalmente en dehesas de viejos fresnos trasnochados, así como en zonas verdes con árboles añosos donde pueda encontrar oquedades en las que refugiarse y establecer su nido.



## ● MOCHUELO

*Athene noctua*

21-23 CM/ DIFÍCIL

Pequeño, de cuerpo rechoncho, cabeza grande y llamativos ojos amarillos. Es de hábitos principalmente crepusculares, aunque se le puede observar y escuchar en horas centrales del día, sobre todo en invierno. Emite varios tipos de sonidos, entre los cuales es muy característico una especie de maullido repetitivo. En Alpedrete lo podremos ver y oír sobre todo en dehesas de encina y Fresno y así como en otros terrenos con arbolado disperso, siempre que existan huecos apropiados donde esconderse y establecer sus nidos. Se alimenta sobre todo de micromamíferos e insectos.



● **AUTILLO**  
*Otus scops*  
19-21 CM/ FÁCIL

Pequeña rapaz nocturna, de cuerpo alargado, coloración general grisácea en algunos ejemplares, pardo rojiza en otros, con unas “orejas” poco conspicuas. Resulta muy difícil su observación dado sus hábitos crepusculares y nocturnos, y a que se mimetiza muy bien. No obstante, su presencia se hace bien patente durante los meses de abril y mayo debido a su característico e insistente canto que recuerda al pitido del sónar de un barco. Lo podemos escuchar en parques, jardines, bosques de ribera y otros lugares con arbolado no muy denso.



● **CHOTACABRAS CUELLIRROJO**  
*Caprimulgus ruficollis*  
24-28 CM/ DIFÍCIL

Enigmática ave, cuyo mimético plumaje, aspecto alargado y tendencia a permanecer inmóvil en el suelo, hacen que se camufle perfectamente, pareciendo un tronco seco. Cuando es descubierta o molestada realiza cortos vuelos hasta ocultarse de nuevo entre la vegetación. Desarrolla su actividad durante la noche y el crepúsculo. Se alimenta de insectos a los que atrapa tanto en el suelo como en vuelo. Tiene un canto muy reconocible, que consiste en un sonido electrónico muy repetitivo. Lo podemos encontrar en la Dehesa Municipal, así como en otras zonas de arbolado disperso.



● **VENCEJO COMÚN**  
*Apus apus*  
17 CM/ MUY FÁCIL

Ave de largas, curvas y puntiagudas alas que le dan un aspecto de ancla cuando planea. De color pardo oscuro, podemos observarlos en la época estival volando en grupos en cualquier lugar del municipio. Emiten unos chillidos característicos. Migrador procedente de África, tienen un vuelo rápido y habilidoso. Transcurren toda su vida en el aire, posándose únicamente cuando acuden a sus nidos, los cuales establecen bajo tejas y en otras oquedades de los edificios. Tienen las patas muy cortas y atrofiadas, lo que unido a sus largas alas, les dificulta enormemente que, una vez caigan al suelo, puedan levantar el vuelo.



● **ABUBILLA**  
*Upupa epops*  
27 CM/ FÁCIL

Inconfundible con sus contrastadas alas blancas y negras, muy vistosas en vuelo, y una llamativa cresta que despliega, entre otros motivos, cuando está inquieta. De comportamiento solitario, captura insectos y otros animalillos sondeando el suelo con su largo y curvado pico. Aunque en Alpedrete es un ave tradicionalmente estival, cada vez es menos raro encontrarnos algún ejemplar en los meses de invierno. Habita en dehesas y también acude a parques y jardines donde le gusta buscar alimento en las praderas de césped. Cuando son molestados en sus nidos, tanto los progenitores como las crías se defienden proyectando sus excrementos contra el intruso.



## ● MARTÍN PESCADOR

*Alcedo atthis*

16-17 CM/ DIFÍCIL



De aspecto rechoncho, con un largo pico en forma de estilete y una cabeza desproporcionadamente grande. Presenta una coloración muy llamativa, con el dorso azul iridiscente y la parte inferior del cuerpo de color naranja. El macho se distingue de la hembra por tener el pico completamente negro mientras que esta última presenta la parte inferior de color anaranjado. Ave asociada a humedales, se alimenta de peces, renacuajos, cangrejos y otros animales acuáticos a los que captura

lanzándose en picado desde un posadero cercano. De carácter solitario y muy desconfiado, podemos sorprenderlo posado junto a alguna cantera, aunque al verse descubierto huirá mediante un rapidísimo y decidido vuelo y emitiendo un reclamo agudo y penetrante. Para criar excava un profundo túnel en algún talud arenoso próximo a la orilla. En Alpedrete suele ser más habitual observarlos fuera del período reproductor.

## ● ABEJARUCO EUROPEO

*Merops apiaster*

27-29 CM/ DIFÍCIL

De aspecto esbelto, con alas puntiagudas y cola larga, esta preciosa ave es inconfundible por sus contrastados y vivos colores, donde se intercalan tonos azules, amarillos y rojos. Macho y hembra presentan la misma coloración. Tienen un pico alargado y curvo, con el que captura abejas y otros insectos en pleno vuelo. Generalmente se le observa en zonas de escasa vegetación arbórea, volando en grupos fácilmente identificables por sus incesantes y característicos reclamos. Nidifica en agujeros que ellos mismos excavan en taludes arenosos, constituyendo colonias de cría.



## ● PITO REAL

*Picus viridis*

31-33 CM/ DIFÍCIL

De tamaño similar a una paloma, es característico el color rojo de la cabeza y su plumaje verdoso con un llamativo obispillo verde chillón muy aparente durante el vuelo. A diferencia del pico picapinos, se alimenta con asiduidad en el suelo, donde atrapa insectos y otros animalillos, aunque también picotea la madera de los árboles en busca de alimento. Construye sus nidos realizando profundos huecos en los troncos de los árboles. Produce un estridente sonido que recuerda al relincho de un caballo. De carácter solitario, en Alpedrete lo podemos encontrar en dehesas así como en parques y jardines.



● **PICO PICAPINOS**  
*Dendrocopos major*  
23-26 CM/ DIFÍCIL

De morfología similar al pito real pero de menor tamaño que éste. Fácilmente reconocible por sus contrastada coloración, con tonos negros, blancos y rojos. Se trata de una especie forestal que se alimenta de insectos y frutos secos que obtiene de los árboles. Para ello presenta una serie de adaptaciones: un pico fuerte con el que puede agujerear la madera y una estructura craneal adaptada a los violentos golpes que ejecuta con el pico; plumas rectrices endurecidas, que le permiten apoyar la cola en los troncos y mantenerse verticalmente sobre ellos; una distribución de los dedos idónea; y una lengua retráctil, alargada y pegajosa con la que atrapa insectos introduciéndola en grietas y galerías de la madera. En Alpedrete lo podemos encontrar en el robledal del paraje conocido como "Cercas de Ávila", así como en otras zonas con suficiente arbolado maduro. Tiene un sonoro reclamo. En primavera es frecuente escuchar el tamborileo con el que los machos atraen a las hembras y marcan sus territorios.



● **COGUJADA COMÚN**  
*Galerida cristata*  
18 CM/ MUY DIFÍCIL

De tamaño poco mayor que un gorrión, discreto plumaje y con una puntiaguda cresta que puede ayudar a distinguirla de otras especies similares. De hábitos terrestres, camina con frecuencia por el suelo en busca de alimento y se posa en muretes y otras elevaciones del terreno. Como otros aláudidos, tiene un melódico canto. Construye el nido en el suelo siendo la coloración de los huevos muy mimética para pasar desapercibidos a los depredadores. Escasa en el municipio, aparece en zonas adeshadas con amplias zonas de pastos y praderas, fundamentalmente en los meses de invierno.



● **TOTOVÍA**  
*Lullula arborea*  
15 CM/ DIFÍCIL

Algo menor que la cogujada y con el pico más pequeño, también se diferencia de ésta por carecer de cresta, por presentar una ceja blanca bien marcada y por una característica mancha blanca y negra en el borde del ala que se puede apreciar cuando está posada. Especie más abundante en el municipio que la cogujada, es de hábitos más forestales que ésta. Habita en zonas de matorral y pastizal con presencia de arbolado disperso. La podemos observar en las zonas más elevadas del Cerro del Cañal. Al igual que la cogujada, realiza el nido en el suelo.



## ● GOLONDRINA COMÚN

*Hirundo rustica*

18 CM/ MUY FÁCIL



De cuerpo estilizado, con alas largas y una característica cola con sobresalientes plumas rectrices en forma de "v". Vuelan durante buena parte del tiempo, generalmente a baja y media altura, esquivando con habilidad los obstáculos. Se posan con frecuencia en cables de tendidos eléctricos y otros posaderos similares. Esta ave migratoria regresa del continente africano cada primavera y se distribuye por diferentes áreas urbanas y agrestes del municipio. Suelen ocupar los mismos nidos año tras año. Éstos tienen forma de cuenco abierto y los sitúan bajo puentes, en garajes,

desvanes y otras construcciones humanas, adheridos a alguna pared. Los construyen con barro que recogen de suelos encharcados y lo mezclan con su propia saliva. El interior lo acolchan con hierba seca, plumas y otros materiales aislantes. Las parejas reproductoras suelen ser las mismas cada temporada. Se alimentan de insectos que capturan al vuelo, por lo que ejercen una gran labor eliminando mosquitos de los pueblos y ciudades.

## ● AVIÓN COMÚN

*Delinchon urbicum*

14 CM/ MUY FÁCIL

De aspecto general similar a la golondrina, es menos estilizado que ésta y con la cola más corta y sin horquilla. De comportamiento similar, pasa mucho tiempo en vuelo alimentándose de mosquitos y otros insectos, aunque generalmente a mayor altitud que aquélla. También se posan con frecuencia en cables de tendidos eléctricos y otros lugares similares. Forman colonias de cría y construyen nidos de barro con forma de esfera que adhieren a los aleros de las viviendas y otras construcciones. Ave muy común en las zonas urbanas de Alpedrete.



## ● BISBITA PRATENSE

*Anthus pratensis*

15 CM/ MUY DIFÍCIL

Del tamaño de un gorrión pero de morfología más estilizada; con patas relativamente "largas", pico fino y discreta coloración. Estas aves pasan buena parte del tiempo alimentándose en pequeños grupos en superficies de pastizales y praderas, por lo que pasan bastante desapercibidas. Se alimentan de insectos y semillas. Sus agudos reclamos nos ayudarán a descubrirlas e identificarlas. En Alpedrete no es una especie abundante, apareciendo en la Dehesa Municipal y otras zonas adeshadas tan sólo durante los meses de invierno.



● **LAVANDERA  
BLANCA**  
*Motacilla alba*  
18 CM/ MUY FÁCIL

Inconfundible y popular ave, la predominancia del blanco en su plumaje hace que localmente se la denomine "pajarita de las nieves". Nos la encontramos en plazas, calles, tejados y azoteas, así como en zonas húmedas y praderas, casi siempre caminando por la superficie del suelo con un gracioso movimiento de cabeza y levantando la cola en repetidas ocasiones. Se alimenta de insectos que persigue por el suelo y sus inmediaciones, realizando a veces rápidos vuelos y requiebros. Tiene un reclamo característico que emite con frecuencia. De carácter generalmente solitario, en invierno se suelen reunir en dormideros.



● **LAVANDERA  
CASCADEÑA**  
*Motacilla cinerea*  
19 CM/ FÁCIL

Similar a la lavandera blanca, pero con tonos amarillos en la partes inferiores del cuerpo cabeza y cola. Las partes superiores son de un tono gris pizarra. De hábitos más agrestes y con mayor dependencia al agua, la podemos encontrar en arroyos, charcas, canteras y prados húmedos. De comportamiento semejante al de la lavandera blanca, pasa mucho tiempo en el suelo buscando insectos. Tiene un característico reclamo que normalmente emite en pleno vuelo. Construyen el nido en el suelo o a baja altura, en algún hueco o entre la vegetación.



● **CHOCHÍN**  
*Troglodytes troglodytes*  
9-10,5 CM/ DIFÍCIL

Pequeña y rechoncha ave, con una cola muy corta que con frecuencia mantiene erguida y que le confiere un aspecto muy simpático. Muy inquieta, esta solitaria ave habitualmente se desplaza a saltitos y mediante cortos vuelos por el suelo o próximo a éste, introduciéndose entre arbustos, matorrales, raíces de árboles y otros recovecos. Se la puede observar entre la vegetación de ribera del Arroyo de la Dehesa, así como en otras zonas umbrosas con matorrales y zarzas. También en zonas ajardinadas con frondosos arbustos y matorrales. Los machos emiten un potente y melódico canto durante la época reproductiva.



● **PETIRROJO**  
● *Erithacus rubecula*  
14-16,5 CM/ MUY FÁCIL

Este vistoso pajarillo es inconfundible gracias al intenso color naranja que presentan en el pecho y la garganta tanto los machos como las hembras. Es un ave común en terrenos forestales con suficiente vegetación arbustiva y de matorral, así como en parques, jardines y huertos. Emiten sus cantos y reclamos con frecuencia, ya que son aves muy territoriales. Se suelen mostrar confiados en zonas humanizadas, por lo que no es difícil observarlos a poca distancia.

En Alpedrete es un ave especialmente abundante en invierno. En primavera se desplazan a criar a lugares más frescos y húmedos.



● **RUISEÑOR COMÚN**  
*Luscinia megarhynchos*  
16,5 CM/ FÁCIL

De color ocráceo en las partes superiores y blanquecino en las inferiores, resulta distintivo el tono rojizo de la cola y el obispillo. Esta ave migratoria llega procedente de África en primavera y se instala en zonas de vegetación de ribera y otros lugares con abundancia de zarzales y otras zonas frescas con árboles y arbustos espesos. Muy abundante en la Dehesa Municipal, resulta mucho más fácil oírlo que verlo, pues pasa la mayor parte del tiempo oculto entre la vegetación, donde los machos emiten un melódico y potente canto, incluso durante la noche.



● **COLIRROJO TIZÓN**  
*Phoenicurus ochruros*  
14-15 CM/ MUY FÁCIL

Los machos son de un color negruzco tizón, que hace honor a su nombre, mientras que las hembras son pardogrisáceas. En ambos la cola es de color rojizo, muy identificable a simple vista pues además la mueven con frecuencia mientras emiten sus reclamos, como si tuvieran un tic nervioso. Ave acostumbrada a la presencia del ser humano. Común en el municipio, la podemos encontrar posada en edificios y azoteas. También le gustan los terrenos pedregosos y canteras, así como las zonas adehesadas. El canto es un carraspeo metálico y generalmente lo emite desde posaderos bien visibles. Realiza el nido en oquedades.



● **ZORZAL COMÚN**  
*Turdus philomelos*  
20-22 CM/ MUY DIFÍCIL

Emparentada con el mirlo común, esta ave es ligeramente más pequeña que éste, y con rasgos morfológicos muy similares. Las partes superiores son de tonos pardos y las inferiores blanquecinas con un moteado negro. Al volar se pueden observar las axilas de color marrón que le diferencian del zorzal charlo, que las tiene blancas. Es un ave poco abundante y ocasional, que podemos encontrar en las zonas adehesadas del municipio durante los meses de invierno, procedente de latitudes más septentrionales. Solemos encontrarlos en pequeños grupos. Se alimentan de lombrices, caracoles y otros animalillos en praderas y pastizales, así como de frutos y semillas.



● **ZORZAL CHARLO**  
*Turdus viscivorus*  
26-29 CM/ FÁCIL

Similar al zorzal común pero de mayor tamaño, con las partes inferiores algo más claras y con una característica postura más erguida cuando se posa en el suelo. Al igual que el zorzal común, forma grupos gregarios en los meses de invierno, en zonas con arbolado disperso. Se alimenta con frecuencia en el suelo, buscando lombrices, caracoles y otros invertebrados. También se alimenta de frutos y semillas, siendo fundamental en la dispersión de semillas de enebros y otras especies vegetales que requieren pasar por su tracto digestivo para poder germinar. En la época reproductora lo podemos encontrar en los pinares del Cerro del Cañal.



## MIRLO COMÚN

*Turdus merula*

24-25 CM/ MUY FÁCIL



Su cola alargada y el color del pico (naranja en los machos y amarillento o negrozco en las hembras) lo distingue de otras aves de plumaje negro y similar tamaño, como córvidos y estorninos. También es un carácter distintivo su comportamiento: solitario, corretea por el suelo con agilidad, removiendo tierra y hojarasca con energía en busca de alimento. Esta común ave se dispersa por casi todo el municipio, desde dehesas, robledales, jarales y otras zonas de matorral, hasta zonas verdes urbanas, siempre que haya suficiente cobertura vegetal. Se alimenta de invertebrados

que captura en el suelo, así como de frutos y semillas. Tiene un bonito y aflautado canto que se puede escuchar también durante la noche, pues aprovecha la luz artificial para desarrollar su actividad. Cuando se siente intranquilo emite una especie de cacareo muy ruidoso. Suele elegir parques y jardines para establecer sus territorios de cría, ocultado sus nidos en setos, hiedras y arbolillos con suficiente espesura.

## CURRUCA

### CAPIROTADA

*Sylvia atricapilla*

13 CM/ FÁCIL

De color general grisáceo, destaca en estas aves el capirote, que en los machos es de color negro y en las hembras marrón. Presenta un pico fino como todas las currucas, idóneo para atrapar insectos, aunque también se alimenta de frutos y bayas. De carácter solitario, esta ave habita en zonas con abundante vegetación arbustiva, siendo muy común en parques y jardines, donde resulta más sencillo escuchar su aflautado y melodioso canto y sus secos y carraspeantes reclamos, que observarla a simple vista, pues suele permanecer muy oculta entre la vegetación.



## CURRUCA

### CABECINEGRA

*Sylvia melanocephala*

13-14 CM/ FÁCIL

De cabeza más grande que la curruca capirotada, los machos se diferencian bien por tener la cabeza completamente negra, con un anillo ocular rojo. En las hembras el diseño es igual, pero con la cabeza de color gris y el cuerpo pardo. Se mueve incesantemente entre la vegetación, principalmente arbustos y matorrales, y emite con frecuencia su carraspeante reclamo. Más agreste que la capirotada, la podemos encontrar en terrenos forestales con suficiente cobertura de arbustos y matorrales.



## ● CURRUCA ZARCERA

*Sylvia communis*

14 CM/ DIFÍCIL

Morfológicamente similar a la curruca cabecinegra. El tono gris de la cabeza del macho contrasta con el color pardo del manto, cosa que no sucede en el caso de las hembras, que tienen la cabeza y el manto de un color pardo. Podemos encontrar esta ave en las zonas más frescas de Alpedrete, y con vegetación arbustiva y de matorral, como la Dehesa Municipal y la vaguada del Arroyo del Cañal. De alimentación fundamentalmente insectívora durante la época reproductora, el resto del año también se alimenta de frutos y bayas.



## ● CURRUCA CARRASQUEÑA

*Sylvia cantillans*

12 CM/ FÁCIL

De tamaño pequeño, en los machos destaca el plumaje anaranjado de la garganta y el pecho, la bigotera blanca y el anillo ocular rojo. Las hembras son similares a las de la curruca zarquera, pero con un tono más grisáceo. Es la curruca que se observa con mayor facilidad en el municipio durante el periodo estival. Como todas las curruccas, se mueve incesantemente entre la espesura. Su canto y sus carraspeantes reclamos casi siempre nos alertarán de su presencia. Se encuentra en cualquier terreno forestal del municipio donde exista suficiente densidad de arbustos y matorrales.



## ● CURRUCA RABILARGA

*Sylvia undata*

12-13 CM/ DIFÍCIL

Desataca su larga cola, comparativamente mayor que en el resto de las curruccas, así como el anillo ocular rojo sobre el plumaje gris oscuro de la cabeza. Las hembras son de una coloración más apagada. La podemos observar en cualquier zona de vegetación arbustiva y de matorral, prefiriendo, por norma general, zonas más secas que otras curruccas, como es el caso de los jarales y encinares de Los Berrocales y Mataespesa.



## ● MOSQUITERO

● COMÚN

*Phylloscopus collybita*

10-11 CM/ FÁCIL

Pequeño pajarillo, de color verde apagado en las partes superiores y blanquecino en las inferiores, con una lista superciliar amarilla. Su inquieto comportamiento ayuda a diferenciarlo de algunas otras aves de coloración y tamaño similares: revolotea y salta entre las ramitas, escudriña incesantemente entre el follaje y en ocasiones se suspende en el aire como si fuera un colibrí. En invierno la población local aumenta con la incorporación de ejemplares procedentes de zonas más septentrionales. Se le puede encontrar en cualquier lugar donde exista suficiente cobertura vegetal, incluso en zonas urbanas. Especialmente abundante en lugares con agua y vegetación de ribera, como la Dehesa Municipal.



## ● MOSQUITERO

PAPIALBO

*Phylloscopus Bonelli*

11-12 CM/ MUY DIFÍCIL

Similar al mosquitero común, aunque ligeramente mayor, y con las partes inferiores de color blanco. Este pequeño migrador proveniente del continente africano, elige áreas arboladas densas y frescas para criar. En Alpedrete tan sólo podemos encontrar algunos ejemplares en los lugares más umbrosos y frescos, como el robledal de "Cercas de Ávila" y los pinares del Cerro del Cañal.



## ● REYEZUELO LISTADO

*Regulus ignicapilla*

9 CM/ DIFÍCIL

Una de las aves más pequeñas que podemos encontrar en Alpedrete. De aspecto regordete, presenta un color general verdoso, con las partes inferiores blanquecinas. Tiene un diseño de rayas blancas y negras en la cabeza, con el pileo amarillo, que le diferencia de cualquier otra especie similar. Muy inquietos, revolotean y se cuelgan de las ramillas de árboles y arbustos buscando insectos y arácnidos. En invierno tiene un comportamiento gregario, pudiendo formar bandos mixtos con mosquiteros y otras especies. Lo podemos encontrar en zonas con suficiente arbolado, incluidas las áreas ajardinadas.



## ● PAPAMOSCAS CERROJILLO

*Ficedula hypoleuca*

12-13 CM/ FÁCIL

Esta pequeña ave se diferencia bastante bien por el contrastado color pardo y blanco de su plumaje (negruzco y blanco en el caso de los machos en época de celo). Su postura con las alas entreabiertas cuando está posada y su reclamo incesante, también ayudan a su identificación. Provenientes de África, nidifican en zonas próximas al municipio y será en los meses de agosto, septiembre y octubre cuando podremos observarlos en buen número durante su viaje de regreso a sus zonas de invernada.

Se hacen entonces especialmente abundantes tanto en terrenos adeshados como en bosques, parques y jardines.



## ● CARBONERO COMÚN

*Parus major*

14 CM/ MUY FÁCIL



Esta común ave del tamaño de un gorrión se reconoce bien por el color amarillo de su pecho en el que se dibuja una línea vertical negra, más ancha en el caso de los machos. Sus mejillas blancas sobre el negro de la cabeza también ayudan a su identificación. De carácter curioso, revolotean incesantemente entre la vegetación buscando insectos, frutos y semillas, y se posan en el suelo en pocas ocasiones, aunque con más frecuencia que su pariente, el carbonero garrapinos. Tienen una gran

variedad de reclamos. Acuden con facilidad a alimentarse en comederos artificiales.

A la hora de construir sus nidos, utilizan agujeros en árboles, tapias y cualquier otra oquedad que puedan aprovechar, así como cajas-nido. Los podemos observar en cualquier terreno forestal del municipio que tenga suficiente densidad de arbolado, así como en parques, jardines y otras zonas verdes.

● **CARBONERO GARRAPINOS**  
*Periparus ater*  
11,5 CM/ FÁCIL

Ave pequeña y rechoncha, con un diseño de la cabeza muy similar al del carbonero común, y con un plumaje dominado por colores grises, con las partes inferiores claras. Fuera de la época de reproducción suelen formar grupos y en ocasiones se mezcla con individuos de otras especies. Se cuelgan a menudo de ramillas finas y revolotean entre ellas en busca de comida. Ave muy confiada, en ocasiones podremos observarla a muy corta distancia. La podremos ver en zonas con suficiente vegetación arbórea, aunque tiene predilección por los pinares.



● **HERRERILLO CAPUCHINO**  
*Lophophanes cristatus*  
11,5 CM/ DIFÍCIL

Esta pequeña ave resulta inconfundible gracias a la elegante cresta que presentan tanto los machos como las hembras. De comportamiento "hiperactivo", como otros páridos, se desplaza constantemente entre las ramas de los árboles. Emiten con frecuencia su agudo reclamo, el cual nos ayudará a detectarlo e identificarlo. En Alpedrete es más fácil de observar fuera del período de cría, momento en que suele formar pequeños bandos, siempre en zonas con suficiente densidad de vegetación arbórea.



● **HERRERILLO COMÚN**  
*Cyanistes caeruleus*  
11,5 CM/ MUY FÁCIL

De tamaño menor que el carbonero común y con un bonito diseño blanco y azul en la cabeza, siendo también azul el color de las alas y la cola. De comportamiento similar al de otros páridos, se mueve incesantemente entre las ramillas exteriores de los árboles en busca de insectos, pequeños frutos y semillas. Al igual que otros carboneros y herrerillos, acude a comederos artificiales y anida en oquedades. Tienen proles muy numerosas, de hasta 12 pollos. Habita en cualquier zona del municipio con arbolado suficiente, incluso en parques y jardines.



● **MITO**  
*Aegithalos caudatus*  
12-14 CM/ FÁCIL

Estas pequeñas y bonitas aves se reconocen con facilidad por su larga cola, que sobresale en relación a un cuerpo pequeño y rechoncho, con una cabeza grande y un pico diminuto. Sociables y gregarios, los mitos constituyen bandos de varios ejemplares que se mueven incansablemente en busca de alimento entre árboles, arbustos y matorrales, emitiendo sus constantes reclamos. Se alimentan de insectos y ácaros y los podremos observar en lugares arbolados, incluidos parques y jardines. Construyen un nido con forma de esfera que tapizan con líquenes de forma que pasan desapercibidos entre la vegetación.



## ● TREPADOR AZUL

*Sitta europea*

12-14 CM/ DIFÍCIL

Pequeña y robusta ave, muy fácil de identificar, tanto por su morfología y color como por su peculiar comportamiento, ya que trepa constantemente por los troncos y las ramas, poniéndose boca abajo en numerosas ocasiones. También se cuelga con frecuencia de las ramillas. Se alimenta de invertebrados así como de frutos y semillas cuyas cáscaras son capaces de romper con fuertes picotazos. Nidifica en oquedades haciendo más pequeño el agujero de entrada utilizando barro. Lo podemos encontrar en algunas zonas arboladas del municipio, siendo más abundante en el robledal de "Cercas de Ávila".



## ● AGATEADOR COMÚN

*Certhia brachydactyla*

12 CM/ DIFÍCIL

Este pajarillo resulta inconfundible por su mimético plumaje, pico largo y curvo y, sobretodo, por su ágil manera de trepar por los troncos y ramas de los árboles, en busca de invertebrados que atrapa introduciendo su fino pico en las grietas y orificios de la madera. Cuando se posa en posición vertical sobre los troncos se ayuda de su cola, que la apoya contra la superficie de la madera. Generalmente solitarios, en Alpedrete los podemos observar en zonas con árboles añosos, principalmente en fresnedas, así como en encinar y robledal. Establecen sus nidos en agujeros de árboles, tapias y lugares similares.



## ● ALCAUDÓN REAL

*Lanius meridionalis*

24-25 CM/ DIFÍCIL



Del tamaño de un mirlo, se distingue fácilmente por su coloración general grisácea en el dorso, con las partes inferiores blanquecinas, su cola larga y su cabeza grande, en la que destaca un antifaz negro. De carácter solitario, suele posarse en las ramas altas de árboles y arbustos durante bastante tiempo, lo cual nos facilitará su localización e identificación. Es un gran depredador para su pequeño tamaño, pues atrapa micromamíferos, reptiles y pajarillos, además de insectos. Es ca-

paz de imitar los reclamos de pequeñas aves para localizarlas y atraerlas hacia ellos, y así poder capturarlas. Al no tener mucha fuerza en las patas, tiene costumbre de ensartar a sus presas en las espinas de los majuelos y otros arbustos pinchudos así como en los vallados de alambre de espino, para poder despiezarlas, y utilizarlos además como despensa. Podemos observarlo en zonas adeshadas del municipio, principalmente en la Dehesa Municipal y en el Cerro del Cañal.

## ● URRACA

*Pica pica*

40-51 CM/ MUY FÁCIL

Esta conocida ave es inconfundible por su cola larga y el diseño blanquinegro de su plumaje, cuyo color negro adquiere iridiscencias, con brillos metálicos verdes y azulados. Las parejas viven juntas y cooperen durante toda la vida. Se trata de un ave muy inteligente y oportunista, que puede comer casi cualquier cosa, siendo un carroñero habitual y llegando en ocasiones a depredar sobre huevos y pollos de otras aves. Tienen especial aberración por las rapaces y otros depredadores, a los que molestan y expulsan de sus territorios siempre que pueden. Se distribuyen por todo el municipio.



## ● RABILARGO

*Cyanopica cyanus*

34-35 CM/ FÁCIL

De morfología similar a la de la urraca y algo menor que ésta, este córvido es inconfundible por el plumaje azulado de su cola y alas, y el capirote negro que cubre casi por completo su cabeza. De carácter sociable, se desplazan en grupos numerosos, emitiendo sus ruidosos reclamos con los que mantienen la cohesión del grupo y con los que se alertan unos a otros de posibles intrusos o amenazas. Su dieta es muy variada, alimentándose de insectos, lombrices, frutos, semillas, carroña y pequeños vertebrados. De requerimientos más agrestes que la urraca en cuanto su hábitat, los encontramos en terrenos forestales con arbolado disperso.



## ● ARRENDAJO

*Garrulus glandarius*

32-35 CM/ FÁCIL

Córvido de bonito plumaje en el que resaltan las manchas azules y negras de sus alas. Cuando vuela destaca el color blanco del obispillo, que se puede distinguir a larga distancia. A veces solitarios y otras en parejas, cuando se sienten molestados emiten un característico graznido. Tienen costumbre de almacenar semillas (especialmente bellotas) para poder aprovecharlas en épocas de escasez de alimento, las cuales se dejan olvidadas en muchas ocasiones, por lo que contribuyen de forma importante a la expansión de los bosques. En Alpedrete podremos observarlos en los alrededores del Cerro del Cañal y de la Dehesa Municipal.



## ● GRAJILLA

*Corvus monedula*

30-34 CM/ MUY FÁCIL

De pequeño tamaño en comparación con otros córvidos, presenta unas tonalidades grisáceas que la diferencian bien de otras aves similares. De carácter sociable, pueden formar grupos numerosos en invierno y constituyen colonias para criar. Tienen un ruidoso reclamo que habitualmente emiten cuando vuelan en grupo, armando bastante algarabía. De dieta omnívora, se alimentan tanto de insectos y otros invertebrados como de semillas, frutos y carroña. Generalmente se alimentan en el suelo. Habitan en zonas adeshadas del municipio, especialmente en las fresnedas, aunque también se pueden observar en el casco urbano.



## ● CORNEJA NEGRA

*Corvus corone*

44-51 CM/ FÁCIL

Similar a un cuervo pero ligeramente menor. La cola es triangular cuando está en vuelo, lo que también le distingue de los cuervos, que la tienen en forma de rombo y más alargada. Además tienen las alas más redondeadas y las baten con más frecuencia. Generalmente forman grupos pequeños, aunque también las podemos ver solas o en parejas. De dieta variada, busca insectos y otros animalillos en el suelo, come semillas y frutos, y es asidua de la carroña y los vertederos. La podemos encontrar en las zonas de arbolado disperso del municipio.



## ● CUERVO

*Corvus corax*

54-67 CM/ FÁCIL

Córido de gran tamaño y robusto, cuando vuela se distingue bien de las rapaces y otros córvidos por su cola larga y romboidal. Baten las alas con menos frecuencia que otros córvidos. Inteligente y oportunista, se alimenta de frutos, semillas, insectos y otros invertebrados; también depreda sobre pequeños roedores, reptiles, huevos, pollos y cualquier animalillo que se ponga a su alcance. Carroñero habitual, acude también a vertederos. Siempre se les ve en parejas, las cuales duran toda la vida. En Alpedrete se pueden observar durante todo el año en las zonas adeshadas, principalmente, y en los alrededores del Cerro del Cañal.



## ● ESTORNINO PINTO

*Sturnus vulgaris*

21-22 CM/ DIFÍCIL

Ave invernante procedente del centro y norte de Europa muy similar al estornino negro. Se diferencia de éste y de otras aves de coloración negra, por el moteado blanquecino que lucen durante la época invernal, así como por los brillos metálicos de su plumaje. En otras zonas de España y del mundo pueden formar bandos muy numerosos, ocasionando molestias por ruidos y excrementos en áreas urbanas. No es el caso de Alpedrete, donde también forman grupos, pero menos numerosos. Aquí los podemos encontrar en zonas de arbolado disperso así como en el casco urbano.



## ● ESTORNINO NEGRO

*Sturnus unicolor*

21-23 CM/ MUY FÁCIL

Muy parecido al estornino pinto, presenta un plumaje negro uniforme, con un brillo que le da un aspecto aceitoso. Su cola corta y pico amarillo le diferencia de córvidos y otras aves similares. Constituyen bandos más o menos numerosos, siendo un ave muy abundante en Alpedrete, donde la podemos encontrar en dehesas, prados, parques, jardines, así como en el casco urbano. Es frecuente verlos posados en las antenas de edificios y lugares similares donde emiten su estridente canto. Tienen la capacidad de imitar el canto de otras aves. Realizan el nido en diferentes tipos de oquedades.



## ● OROPÉNDOLA

*Oriolus oriolus*

24 CM/ DIFÍCIL

Esta bonita ave de tamaño mediano resulta inconfundible por su vistoso colorido amarillo y negro. Las hembras son algo más discretas, con tonos amarillo verdosos y vientre blanquecino. A pesar de su llamativo plumaje, no resulta sencilla su observación dado que casi siempre permanece oculta entre los árboles, donde se alimenta de insectos y frutos. Sin embargo podremos detectar su presencia gracias a su inconfundible canto, de tono burlón, y a sus ásperos reclamos. Los estorninos imitan su canto con frecuencia, lo cual nos puede llevar a confusión. Ave escasa en Alpedrete, podremos encontrarla en el rebollar de "Cercas de Ávila".



● **GORRIÓN COMÚN**  
*Passer domesticus*  
14-15 CM/ MUY FÁCIL

La más familiar de nuestras aves por su estrecha relación con el ser humano y su entorno, al que se ha habituado y del que obtiene refugio, alimento y lugares donde criar. Los machos se pueden diferenciar de otras especies de aves por su píleo de color gris y su babero negro. Las hembras y jóvenes del año tienen el píleo marrón y carecen de babero. Aves inteligentes y oportunistas, tienen múltiples estrategias para obtener alimento, pudiendo comer casi cualquier cosa. En Alpedrete las podemos encontrar en las zonas urbanizadas y sus alrededores.



● **GORRIÓN MOLINERO**  
*Passer montanus*  
12,5-14 CM/ DIFÍCIL

Muy similar al gorrión común, es ligeramente más pequeño que éste. Machos y hembras presentan el mismo plumaje, en el que resulta distintivo el color marrón rojizo del píleo, así como unas mejillas blancas con una mancha negra, que se aprecia bien a simple vista. Aves menos urbanitas que el gorrión común, forman bandos y generalmente acuden a alimentarse al suelo, donde buscan semillas fundamentalmente. En Alpedrete las podemos observar en algunas zonas ajardinadas como la Dehesa Municipal, así como en los alrededores del polideportivo municipal y en otras áreas ajardinadas.



● **PINZÓN VULGAR**  
*Fringilla coelebs*  
14-16 CM/ MUY FÁCIL

De tamaño y proporciones similares a un gorrión, lo podemos distinguir de éste y de otras especies similares por la mancha blanca de los hombros, muy visible a simple vista. Los machos presentan tonos rojizos en el pecho, mejillas y garganta, mientras que las hembras tienen un plumaje más apagado. Se alimentan generalmente en el suelo, donde se desplazan a pasitos y moviendo la cabeza de forma característica. Aves principalmente granívoras. Es abundante en el municipio, donde las podemos observar en prácticamente cualquier zona agreste, así como en algunos parques y jardines.



● **PINZÓN REAL**  
*Fringilla montifringilla*  
14 CM/ MUY DIFÍCIL

De morfología similar a la del pinzón vulgar, esta ave es bastante fácil de diferenciar por su contrastado plumaje, con las partes inferiores de color blanco con zonas anaranjadas en el pecho y garganta. En las zonas dorsales se alternan tonos anaranjados con diseños blancos y negros. De carácter social, forman grupos en los que a veces se mezclan con otras especies. Es un ave migratoria invernante procedente del norte de Europa y Asia. En Alpedrete se puede observar de forma local en algunas zonas del Cerro del Cañal.



● **PARDILLO COMÚN**  
*Carduelis cannabina*  
13 CM/ FÁCIL

Ligeramente más pequeño que un gorrión y de aspecto más estilizado, destaca el tono rojizo del pecho y frente de los machos, mucho más intenso durante el período reproductor y ausente en hembras y jóvenes. Sus agudos cantos y reclamos también nos pueden ayudar a identificarlos. Como el resto de fringílidos forman bandos durante los meses fríos. Se alimentan casi siempre en el suelo, así como en la vegetación herbácea próxima al mismo. Los podemos encontrar en lugares con arbolado disperso y en herbazales, sobre todo donde haya abundancia de semillas de las que alimentarse



● **LÚGANO**  
*Carduelis spinus*  
12 CM/ MUY DIFÍCIL

Esta pequeña ave se distingue de otras similares por las manchas negras y amarillas de las alas y, en el caso de los machos, por el capirote y garganta negros. Su pico es cónico y afilado. Forman grupos más o menos numerosos y a veces se mezclan con otros fringílidos. Se alimentan sobre todo de semillas y frutos que obtienen del suelo, así como de los árboles y de la vegetación herbácea. Su abundancia es muy variable de unos años a otros. En Alpedrete lo podemos encontrar en El Cerro del Cañal y otras zonas de arbolado disperso, así como en algunos parques y jardines.



● **VERDERÓN COMÚN**  
*Chloris chloris*  
15 CM/ MUY FÁCIL



De aspecto robusto en comparación con otras aves de similar tamaño y colorido, presenta además una cabeza grande y un pico fuerte. Los machos son de un llamativo color verde con plumas amarillas en alas y cola. Las hembras presentan un diseño similar, pero con una coloración general gris verdosa, más apagada. En los meses de invierno suelen formar grupos, en ocasiones mezclados con otras especies como verdecillos o jilgueros. En esta época se alimentan sobre todo de semillas, frecuentando zonas de

arbolado disperso con abundancia de cardos y otras herbáceas. Cuando llega la temporada reproductora, los bandos se dispersan, siendo frecuente que las parejas establezcan sus nidos en áreas ajardinadas, por lo que durante este momento del año resulta sencillo observarlos en zonas urbanas del municipio. En esta época es fácil escuchar el característico canto de los machos. Durante la reproducción su dieta se vuelve más insectívora, por la abundancia de estos animales y por el valor nutritivo que éstos constituyen para sus crías.

● **JILGUERO**  
*Carduelis carduelis*  
12 CM/ FÁCIL

Inconfundible por su llamativo plumaje. Los machos y las hembras presentan el mismo colorido. Emiten sus cantos y reclamos con mucha frecuencia, lo cual nos puede ayudar a detectarlos e identificarlos. De comportamiento sociable durante los meses fríos, pueden formar numerosos bandos. Es fácil observarlos posados en árboles o comiendo en el suelo o en plantas herbáceas. Les encantan las semillas de los cardos, a las cuales pueden acceder sin pincharse gracias a su afilado pico, por lo que frecuentan zonas donde existe este tipo de vegetación, como es el caso de la Dehesa Municipal y sus alrededores.



● **VERDECILLO**  
*Serinus serinus*  
11,5 CM/ FÁCIL

Este menudo pajarillo resulta fácilmente reconocible, además de por su pequeño tamaño, por su pico corto y su plumaje verdoso con un barreado negro en pecho y dorso. Los machos son más llamativos que las hembras, con tonos verde amarillentos en el pecho y la cabeza. Ave sociable durante los meses de invierno. Acuden con frecuencia al suelo y a la vegetación herbácea anual, de donde obtienen las semillas que ingieren. El canto consistente en un gorjeo estridente y prolongado. Abundante en Alpedrete, se encuentra en terrenos agrestes donde no haya excesivo arbolado, así como en zonas ajardinadas.



● **PICOGORDO**  
*Coccothraustes coccothraustes*  
18 CM/ DIFÍCIL

Peculiar e inconfundible ave, por su cuerpo rechoncho, cola corta, cabeza voluminosa y pico desproporcionadamente grueso. Presentan un bonito diseño en el plumaje, siendo las hembras de colores algo más apagados. Sus reclamos son agudos y discretos. Viven en pequeños grupos o en parejas. Se alimentan sobre todo de semillas, las cuales pueden abrir gracias a la fuerte presión que son capaces de ejercer con su pico. Aunque es un ave que pasa bastante desapercibida, la podemos observar en los parques y jardines del municipio, así como en terrenos forestales con suficiente masa arbórea.



● **PIQUITUERTO**  
*Loxia curvirostra*  
15-17 CM/ DIFÍCIL

De esta ave destaca su curioso pico, que se entrecruza y que hace honor a su nombre. Los machos resultan inconfundibles por su bonito plumaje rojo oscuro. Las hembras son de color verde, mientras que los machos son pardos. De comportamiento muy gregario, se desplazan en grupos emitiendo su característico reclamo mientras vuelan a cierta altura. Durante la mayor parte del año su dieta se basa en semillas de los pinos, las cuales logran extraer de las piñas gracias a su especializado pico. Lo podemos observar en los pinares del Cerro del Cañal.



## ● ESCRIBANO SOTEÑO

*Emberiza cirilus*

15-16,5 CM/ MUY DIFÍCIL



Esta pequeña ave se reconoce por los tonos amarillos de su plumaje- más chillones en los machos, sobre todo en época de celo-, y por el diseño de líneas negras de la cabeza, también más patente en los machos. Tienen un canto característico que también nos puede

ayudar a su identificación. En invierno suelen formar grupos. Tiene predilección por lugares con cierta humedad, como riberas de ríos y sotos. En Alpedrete es un ave escasa. La podemos encontrar en las dehesas de fresnos, así como en la Dehesa Municipal.

## OTRAS ESPECIES MENOS FRECUENTES

Existen otras especies que aparecen en el municipio con mucha menor frecuencia, y que podemos ver esporádicamente. En la mayor parte de los casos su presencia se debe a pasos de desplazamientos migratorios o bien a movimientos locales estacionales. Algunas de estas especies son las siguientes:

- ✓ Cigüeña negra (*Ciconia nigra*)
- ✓ Cuco (*Cuculus canorus*)
- ✓ Críalo (*Clamator glandarius*)
- ✓ Búho chico (*Asio otus*)
- ✓ Golondrina dáurica (*Hirundo daurica*)
- ✓ Acentor común (*Prunella modularis*)
- ✓ Zorzal alirrojo (*Turdus iliacus*)
- ✓ Colirrojo real (*Phoenicurus phoenicurus*)
- ✓ Zarcero común (*Hippolais polyglotta*)
- ✓ Mosquitero musical (*Phylloscopus trochilus*)
- ✓ Mosquitero silbador (*Phylloscopus sibilatrix*)
- ✓ Reyzeuelo sencillo (*Regulus regulus*)
- ✓ Alcaudón común (*Lanius senator*)
- ✓ Verderón serrano (*Serinus citrinella*)
- ✓ Escribano montesino (*Emberiza cia*)

## LAS SILUETAS EN VUELO DE LAS RAPACES DIURNAS

Dado que en la mayoría de las ocasiones estas aves sólo las podremos observar durante el vuelo, es conveniente reconocer los matices que las distinguen durante el mismo. Por ello, a continuación se muestra una comparativa entre las siluetas en vuelo de las rapaces diurnas de Alpedrete.

BUITRE NEGRO



BUITRE LEONADO



ÁGUILA REAL



ÁGUILA IMPERIAL



CULEBRERA EUROPEA



ÁGUILA CALZADA



RATONERO



ABEJERO EUROPEO



MILANO REAL



MILANO NEGRO



AZOR



GAVILÁN



CERNÍCALO VULGAR



## AGRADECIMIENTOS:

A Guiomar, por brindarme la oportunidad de participar en este bonito proyecto. A Carlos, a Pedro y a Alfonso Robledo, por su asesoramiento. A Ángela, Sandra, Marta y a mi hermana por su apoyo y sus siempre constructivas opiniones. Y a todas aquellas personas con inquietudes y pasión por respetar y aprender sobre los tesoros del medio natural.

**BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA**, donde se puede encontrar más información sobre las aves que habitan en Alpedrete y alrededores:

- DEL MORAL, J.C., MOLINA, B., DE LA PUENTE, J. Y PÉREZ-TRIS, J. *Atlas de aves invernantes de Madrid*. 1999-2001. SEO-Monticola, Madrid.
- GÓMEZ AOIZ, J. Y FUENTE GÓMEZ, U. *Cuándo y dónde ver aves en Madrid*. (2017). Colección Birding Series, Castellón.
- RICO, J. *Con las aves por la comunidad de Madrid: Paisajes, rutas, guía de especies*. (2006). Editorial La Librería, Madrid.

## WEBS:

- AVES DE MADRID. <https://federovira.wixsite.com/avesmadrid>
- SEO BIRDLIFE. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ORNITOLOGÍA. <https://www.seo.org/>
- SEO SIERRA DE GUADARRAMA. <https://seogadarrama.blogspot.com/>



AYUNTAMIENTO DE ALPEDRETE

[WWW.ALPEDRETE.ES](http://WWW.ALPEDRETE.ES)

